

肺炎球菌、五種混合、ロタ、B型肝炎、BCGの乳児早期の予防接種に関する説明 (たかだ小児クリニック)

1. **B型肝炎ワクチン (HB)** 1才以上10才未満1回 5030円

生後2か月から4週以上間隔で2回、更に20-24週おいて1回

2. **肺炎球菌ワクチン (バクニューバンス)**

生後2か月から4週以上の間隔で3回、
60日以上あけて生後1歳以降で追加1回

3. **五種混合ワクチン (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、HIB)**

生後2か月から4週以上間隔で3回、その後1年から2年の間に追加1回

4. **ロタウイルスワクチン (ロタリックス)**

生後42日目から168日までに4週以上の間隔で2回、

ロタウイルスワクチン (ロタテック) 要予約

生後42日目から224日までに4週以上の間隔で3回

5. **BCG**

生後5-6か月時に保健センターにて接種、(1才まで)

見 本

●生後2か月からの接種例 (1/1生まれとして、ロタリックスの場合)

生後2か月から

4週以上あけて (生後3か月ころ)

4週間以上おいて (生後4か月ころ)

ロタ①+肺炎球菌①+五種混合①+HB①

ロタ②+肺炎球菌②+五種混合②+HB②

肺炎球菌③+五種混合③

3/1

3/29

4/26

BCG

5/3ころから

●生後3か月からの接種例 (1/1生まれとして、ロタリックスの場合)

生後3か月

4週間以上おいて (生後4か月ころ)

4週間以上おいて (生後5か月ころ)

ロタ①+肺炎球菌①+五種混合①+HB①

ロタ②+肺炎球菌②+五種混合②+HB②

肺炎球菌③+五種混合③

4/1

4/29

5/27から

BCG

6/3ころから